





100741



№5

Для старта и коротких курсов терапии нейропатической боли ...



№30

Для длительных курсов терапии нейропатической боли ...

Единственный* пластырь с лидокаином

Одна аппликация в сутки⁴

Доказанная эффективность

- ✓ Входит в российские и международные рекомендации по лечению нейропатической боли¹⁻⁴

Благоприятный профиль безопасности¹⁻⁴

- ✓ Низкая вероятность системных побочных реакций
- ✓ Разрешен к применению пожилым людям
- ✓ Подходит для комбинированной терапии

*На российском рынке фармацевтических препаратов. Государственный реестр лекарственных средств, <https://grls.rosminzdrav.ru>. Согласно информации из исследования ООО «Ипсос Комкон» в практике назначений амбулаторно-поликлинических врачей «Версатис» является единственным пластырем с лидокаином по состоянию на 1 квартал 2021 года. 1. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision; 2. Nanna B Finnerup et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NeuRSIG recommendations. Lancet Neurol: 2015 February; 14(2):162-173; 3. Нейропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению. Под общей ред. Н.Н. Яхно. Москва, 2018 г.; 4. Левин О.С. Применение пластин с лидокаином при лечении боли в спине. Consilium medicum. 2007; 8: 70-76.

Сокращенная информация по применению лекарственного препарата Версатис, пластырь. Показания к применению: нейропатическая боль, ассоциированная с ранее перенесенной герпетической инфекцией (Herpes zoster), постгерпетическая невралгия. Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему и вспомогательным веществам препарата или к местным анестетикам группы амидов; воспаление или нарушение целостности кожных покровов в месте аппликации пластыря (например, высыпания herpes zoster, атопический дерматит или раны). Побочные реакции: так как препарат применяется наружно, в большинстве случаев нежелательные реакции носят местный характер и возникают в области применения пластыря (эритема, сыпь, кожный зуд, чувство жжения, дерматит в месте аппликации). Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.