

Простое решение сложной нейропатической боли

РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ БОЛИТ



5 пластырей в упаковке



30 пластырей в упаковке

Единственный¹ пластырь с лидокаином

- ✓ **Доказанная эффективность:**
входит в российские и международные рекомендации по лечению нейропатической боли^{2,3,4}
- ✓ **Благоприятный профиль безопасности^{2,3,5}:**
 - низкая вероятность системных побочных реакций
 - разрешен к применению пожилым людям
 - подходит для комбинированной терапии
- ✓ **Одна аппликация в сутки⁵**
- ✓ **Защита гиперчувствительного участка кожи⁶**
- ✓ **Нет необходимости в титрации дозы⁵**

1. По данным Государственного реестра зарегистрированных лекарственных средств <http://grls.rosminzdrav.ru> на 2 апреля 2020

2. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision

3. Nanna B Finnerup et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NeuPSIG recommendations. Lancet Neurol. 2015 February ; 14(2): 162–173





4. Нейропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению. Под общей редакцией академика РАН Н.Н. Яхно. 2018г.

5. Инструкция по медицинскому применению препарата Версатис

6. Левин О.С. Применение пластин с лидокаином при лечении боли в спине. Consilium medicum. 2007; 8: 70-76.

5% пластырь с лидокаином включен в Российские и международные рекомендации по лечению невропатической боли

- Невропатическая боль. Клинические рекомендации по диагностике и лечению. Под общей ред. Н.Н.Яхно. Москва, 2018г
- Национальное руководство Неврология под ред. Гусева Е.И., 2019г
- Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NeuPSIG* recommendations. Nanna B Finnerup et al. Lancet Neurol. 2015г
- EFNS** guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision



*NeuPSIG - The Neuropathic Pain Special Interest Groups, группа исследователей по изучению нейропатической боли, является частью IASP - International Association for the Study of Pain, международной ассоциации по изучению боли.

**EFNS - The European Federation of Neurological Societies, Европейская федерация неврологических обществ

Версатис – топическая форма, воздействующая на ЦНС¹


Функциональная МРТ мозговой активности у пациентов с нейропатической болью при постгерпетической невралгии¹




В отличие от пластыря Версатис, пластыри с НПВП действуют местно, купируя боль воспалительной природы

Пластырь с 5% лидокаином (Версатис) обладает сравнимой эффективностью и лучшей переносимостью по сравнению с прегабалином при терапии локализованной нейропатической боли.

Количество пациентов, ответивших на терапию*
через 4 недели от начала лечения



Количество пациентов, вынужденных прервать лечение из-за НР**,
связанных с приемом препарата



*Ответом на терапию считалось снижение интенсивности боли ≥ 2 баллов

**НР – нежелательная реакция



По материалам: Baron R, Mayoral V, Leijon G et al. 5% lidocaine medicated plaster versus pregabalin in post-herpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy: an open-label, non-inferiority, two-stage RCT study. Curr Med Res Opin 2009, 25 (7): 1663-1676

Способ применения пластыря Версатис*

- Кожа должна быть сухая и неповрежденная, при необходимости волосы состричь (не сбривать)
- Использовать одновременно не более 3-х пластин, если болезненная область небольшая, то пластину можно разрезать до удаления защитной пленки
- *Использовать в режиме 12/12* – 12 часов пластырь на коже, 12 часов перерыв




**Вскрыть саше выше
линии «замка»**



**Достать нужное
количество
пластин и закрыть
саше**



**Удалить
защитную
пленку**



**Наложить на
болезненную
область**