


БОЛЬ – ПОД КОНТРОЛЬ!

БЫСТРЫЙ*^{1,2,5,8} И МОЩНЫЙ³ НПВП
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА



- Благоприятный профиль безопасности^{4,5}
- Действует на ключевые механизмы развития воспаления и боли^{1,6,7}
- Удобство применения – перорально, в/м, в/в, а также таблетки с быстрым высвобождением Ксефокам Рапид¹



* Лорноксикам для в/м введения и лорноксикам с быстрым высвобождением (рапид) характеризуется сравнимым временем достижения t_{max} . Медиана времени до начала обезболивающего действия при терапии лорноксикамом с быстрым высвобождением составляет 30 минут. 1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Ксефокон 2. Reuther-Hille S, et al. Clin. Drug. Investig. 2009; 29: 345-51. 3. Mehlert S E, et al. J. Clin. Pharmacol. 1995; 35: 693-14. 4. Сниженный риск развития нежелательных гастроинтестинальных реакций по данным метаанализа Parada P, et al. Pain Manag. 2019 Oct 8;9: 1445-54. 5. Maller P L, et al. Clin. Drug. Investig. 2008; 28: 757-66. 6. Victor Gorsky, et al. Pains-Volume 44, Number 5, July 2015: 824-830. 7. Araque, Manar pain, Marq 2016, № 2, C, 18-22. 8. Yakhno N, Guekht A., Skoromets A., et al. Clin. Drug. Investig. 2006; 26: 267-77. Сокращенная информация по применению. Торговое название препарата: Ксефокам/Ксефокам Рапид. МНН: Лорноксикам. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления р-ра для в/в и в/м введения, таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Показания к применению: Кратковременное лечение легкого или умеренного острого болевого синдрома (все формы выпуска). Симптоматическая терапия боли и воспаления на фоне остеоартрита и ревматоидного артрита (все формы выпуска, кроме таб. Ксефокам Рапид). Противопоказания: гиперчувствительность к лорноксикаму или одному из компонентов препарата, сочетание: бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух, ринит, ангионевротический отек, крапивница и непереносимость АСК и других НПВС; тромбоцитопения; желудочно-кишечные кровотечения или перфорация язвы в анамнезе, связанные с приемом НПВП; активная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови, а также постоперационный период, сопряженный с риском кровотечения; период после проведения аортокоронарного шунтирования, артерио-венозные и воспалительные изменения ЖКТ в стадии обострения, активное ЖКТ-кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение; декомпенсированная сердечная недостаточность, печеночная недостаточность или активное заболевание печени; выраженная почечная недостаточность, прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия; беременность, период грудного вскармливания; датский возраст до 18 лет. Способ применения и дозы: 8-16 мг/сут в 2-3 приема. Длительность терапии определяет врач. Ксефокам Рапид: в первый день лечения может быть назначено 16 мг в начальной дозе и 8 мг через 12 час. Побочное действие: Частое: тошнота, боль в животе, диспепсия, расстройство пищеварения, диарея, рвота, кратковременные головные боли, слабость, головокружение, головная боль, шум в ушах, сердцебиение, тахикардия, отек, сердечная недостаточность, повышение показателей тестов функции печени, сыпь, зуд, головные боли, артралгия, недомогание. Полный перечень побочных эффектов содержится в инструкции по применению. Особые указания: Пациентам с головокружением или сонливостью во время лечения лорноксикамом следует воздерживаться от вождения автомобиля и управления техникой. Не следует применять препарат одновременно с другими НПВП. При появлении признаков поражения печени следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Может изменять свойства тромбоцитов, но не заменяет ацетилсалициловую кислоту. Полная информация по применению содержится в инструкции по медицинскому применению.

Информация предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Подлежит распространению только в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. АО «НИКОФАРМ», 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Бокс № 459, ул. Салганская, 7, Тел.: +7 831 275 8088, 8 800 250 50 00, Факс: +7 831 480 7213, www.stada.ru, Код материала: RUFEPP0818/0031. Дата публикации: 10 июля 2020 г. <https://stada.ru/landing/ksefokam>

Реклама



STADA