

МАТАРЕН® ПЛЮС

мелоксикам 3% + настойка перца стручкового 10% (капсаицин), крем 30 г, 50 г



Двойное
воздействие
на боль
и воспаление¹



Противоотечное
действие¹



Значительное
уменьшение
мышечной боли
через 30 минут²



Способствует
снижению потребности
с системных НПВП
в 2,5 раза²

**Усиленный
обезболивающий и
противовоспалительный
эффект¹**

Наиболее эффективная
дозировка мелоксикама 3%⁶

Оптимальная концентрация
настойки перца стручкового
10% (капсаицин)⁶

МЕЛОКСИКАМ

- Умеренно селективный в отношении ЦОГ-2, обладает хорошей переносимостью^{3,4}

КАПСАИЦИН

- Повышает биодоступность мелоксикама⁵
- Обеспечивает дополнительный обезболивающий эффект¹
- Улучшает местное кровообращение¹

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Матарен Плюс, крем для наружного применения.
2. Годзенко А.А., Бадюкин В.В., Корсакова Ю.Л. Применение крема Матарен® Плюс при миофасциальном болевом синдроме, РМЖ, неврология №28, 2011.
3. Клинические рекомендации Рациональное использование нестероидных противовоспалительных препаратов. Научно-практическая ревматология. 2018; 56 (прил. 1): 1–29.

4. Бадюкин В.В. Место и значение НПВП в терапии ОА. Современная ревматология. 2006, №1.
5. ГОУ ВПО ННГМА. Отчет о сравнительном изучении биодоступности крема Матарен® и Матарен® Плюс. 2013 г.
6. Данные сравнительного изучения специфического фармакологического действия различных вариантов препарата Матарен Плюс («Нижфарм», Россия), НГМА, 2004 г.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНСЕНСУС 2016¹

Локальные формы НПВП могут использоваться

в качестве дополнительного анальгетика или самостоятельного обезболивающего средства при слабой или умеренно выраженной скелетно-мышечной боли, а также в случае невозможности системного применения НПВП из-за наличия высокого риска осложнений¹.



Сокращенная информация по применению препарата Матарен® Плюс. Состав. 1 г крема содержит действующие вещества: мелоксикам — 30 мг; перца стручкового плодов настойка (перца стручкового настояйка) — 100 мг. **Показания к применению.** Воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата. Ревматические поражения мягких тканей. Болевой синдром: бурсит, тендинит, люмбаго, ишиас, невралгия, миалгия, артралгия, радикулит, посттравматический болевой синдром (травматические ушибы, вывихи, растяжения связок, мышц и сухожилий, разрывы мышц без нарушения целостности кожных покровов), болезненность мышц и суставов, вызванная тяжелыми физическими нагрузками. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 12 лет), нарушения целостности кожных покровов и воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения. **Способ применения и дозы.** Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения — 1–3 раза в сутки. Количество крема и частота применения могут варьироваться в зависимости от площади нанесения и индивидуальной реакции на крем. Для усиления эффекта можно наложить сухую согревающую повязку. **Передозировка.** Случаи передозировки препарата Матарен® Плюс неизвестны. **Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.**

Информация предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Подлежит распространению только в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. АО «Нижфарм», Салганская, д.7, Бокс №459, Нижний Новгород, Россия, 603950. Тел.: +7 (831) 278 80 88, факс: +7 (831) 430 72 13. E-mail: med@stada.ru. www.stada.ru. РУ ЛСР-009О16/10 от 31.08.2010 г.

1. Общие принципы лечения скелетно-мышечной боли. Междисциплинарный консенсус, 2016.

Дата печати материала 21.01.2020 г. Код ММ-01-2020. 504492001LT0018